

### N°51 p148

- En 2015, cette personne aura  $2000 \times 1,03 + 150 = 2210$  € sur son compte épargne.  
En 2016, elle aura  $2210 \times 1,03 + 150 = 2426,3$  € sur son compte épargne.
- D'une année à l'autre, le solde disponible sur le compte épargne augmente de 3 % grâce aux intérêts. Il est donc multiplié par 1,03. De plus, chaque année la personne dépose 150 € sur son compte épargne, on ajoute donc 150 au solde disponible. Ainsi, pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_{n+1} = 1,03u_n + 150$ .
- Pour tout entier naturel  $n$ , on a  $v_{n+1} = u_{n+1} + 5000$   
 $= 1,03u_n + 150 + 5000$   
 $= 1,03u_n + 5150$   
 $= 1,03 \left( u_n + \frac{5150}{1,03} \right)$   
 $= 1,03(u_n + 5000)$   
 $= 1,03v_n$ .  
Donc  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,03$  et de premier terme  $v_0 = u_0 + 5000 = 7000$ .
- Pour tout entier naturel  $n$ , on a  $v_n = v_0 \times q^n = 7000 \times 1,03^n$ .  
D'où  $u_n = v_n - 5000 = 7000 \times 1,03^n - 5000$ .
- Comme  $1,03 > 1$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,03^n = +\infty$ . D'où, par produit,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 7000 \times 1,03^n = +\infty$ . Ainsi, par somme, on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 7000 \times 1,03^n - 5000 = +\infty$ .
- (a) L'appel programme(4000) renvoie 9.  
(b) Au bout de 9 ans, le solde disponible sur le compte épargne dépassera les 4000 €.

### N°49 p147

- (a) La formule saisie dans la cellule B3 est  $= B2/(RACINE(B2^2+1))$ .  
(b) La suite  $(r_n)$  semble être décroissante.  
(c) La suite  $(r_n)$  semble converger vers 0.
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On note  $P_n$  la proposition : «  $0 < r_n \leq 1$  ». On souhaite démontrer que  $P_n$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ . On a  $r_0 = 1$  donc  $0 < r_0 \leq 1$ . On en déduit que  $P_0$  est vraie.

**Hérédité :** On considère un entier naturel  $k$  quelconque tel que  $P_k$  est vraie (hypothèse de récurrence), autrement dit tel que  $0 < r_k \leq 1$ . On souhaite démontrer que  $P_{k+1}$  est vraie, autrement dit que  $0 < r_{k+1} \leq 1$ .

Par hypothèse de récurrence, on a  $0 < r_k \leq 1$ . Comme la fonction  $x \mapsto x^2 + 1$  est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$ , on a  $0^2 + 1 < r_k^2 + 1 \leq 1^2 + 1 \Leftrightarrow 1 < r_k^2 + 1 \leq 2$ .

De plus, la fonction racine carrée est croissante sur  $[0; +\infty[$ , d'où  $\sqrt{1} < \sqrt{r_k^2 + 1} \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow 1 < \sqrt{r_k^2 + 1} \leq \sqrt{2}$ .

Comme la fonction inverse est décroissante sur  $]0; +\infty[$ , on a alors  $1 > \frac{1}{\sqrt{r_k^2 + 1}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$ .

Enfin, par hypothèse de récurrence, on a  $r_k > 0$  d'où  $r_k > \frac{r_k}{\sqrt{r_k^2 + 1}} > 0 \Leftrightarrow 1 \geq r_k > r_{k+1} > 0$ , par hypothèse de récurrence.

Ainsi,  $P_0$  est vraie et, pour tout entier  $k$ , lorsque  $P_k$  est vraie, alors  $P_{k+1}$  est vraie aussi. Par le principe de récurrence, on en déduit que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_n$  est vraie donc  $0 < r_n \leq 1$ .

- D'après la question précédente, pour tout entier naturel  $n$  on a  $r_{n+1} < r_n$  donc la suite  $(r_n)$  est décroissante.

4. Comme la suite  $(r_n)$  est décroissante et minorée, alors elle converge.

$$5. \ell = \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + 1}} \Leftrightarrow \ell(\sqrt{\ell^2 + 1} - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } \sqrt{\ell^2 + 1} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } \ell^2 + 1 = 1$$

$$\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } \ell = 0$$

Donc la suite  $(r_n)$  converge vers 0.